

EUCNEMIDE REcueILLIS À LA BAIE D'ANTONGIL (MADAGASCAR)

PAR M. A. MOCQUERYS,

PAR ED. FLEUTIAUX.

**Pœcilochrus vicinus** n. sp.

9 mill. Voisin de *grossicollis*: forme générale moins massive, moins convexe. Front caréné longitudinalement et marqué au milieu entre les yeux de deux petits points enfoncés. Élytres confusément striés. Saillie prosternale non rebordée. Hanches postérieures plus dilatées en dedans. Dernier segment abdominal moins fortement comprimé au sommet et terminé par une pointe obtuse.

Cette espèce, comme *grossicollis*<sup>1)</sup>, est dépourvue du sillon oblique du métasternum partant de l'épaule.

**Profornax crassus** n. sp.

1.2 mill. 1/2. Corps allongé, atténué en arrière, assez convexe, d'un noir peu brillant, couvert d'une pubescence brune très fine et très clairsemée. Tête à ponctuation assez forte, peu serrée au milieu; front marqué d'un court sillon et impressionné tout à fait en avant. Épistome rétrécie à la base, plus étroite que l'espace compris entre lui et l'œil; bord antérieur sinué avec une échancrure au milieu. Antennes dépassant à peine la base du prothorax, d'un brun noirâtre, assez épaisses et graduellement dentées à partir du troisième article; deuxième article près de trois fois plus court que le suivant. Pronotum plus long que large, épais, parallèle, rétréci seulement près des angles antérieurs, rebordé latéralement, à ponctuation forte, écartée sur le disque, serrée et rugueuse sur les côtés, marquée au milieu d'un sillon lisse très marqué à la base, atténué en avant et atteignant le bord antérieur. Écusson saillant, subquadrangulaire. Élytres graduellement rétrécies en arrière, très légèrement striés, strie suturale seule bien marquée; ponctuation écartée et rugueuse, plus faible en arrière. Dessous noir, à ponctuation assez forte et écartée sur le propectus, fine et serrée sur le reste du corps. Sillon antennaire peu profond, lisse, non rebordé en dedans. Saillie prosternale parallèle, arrondie au sommet. Mésopleures larges, non excavées. Épipleurées des élytres non limitées en dehors par une carène. Épisternes métathoraciques étroits, parallèles. Hanches postérieures dilatées, largement arrondies en dedans, rétrécies en dehors; bord externe plus large que les épisternes. Angles des segments

<sup>1)</sup> Chez *Pœcilochrus grossicollis*, le dernier segment abdominal est fortement comprimé en bec pointu et bidenté dans le sens de la longueur, à la manière des *Pterotarsus* vrais.

abdominaux peu visibles en dessus, en dehors des élytres; dernier segment atténué et comprimé en pointe au sommet. Pattes d'un brun noirâtre avec les tarsi rougeâtres; tibias postérieurs aussi longs que les tarsi: premier article des tarsi postérieurs aussi longs que les suivants réunis; ongles petits, épaissis à la base.

Cette espèce se distingue suffisamment de *Languei* par sa taille deux fois plus grande; sa couleur noire; sa pubescence rare, peu apparente; son pronotum épais, à impression du disque presque nulle.

**Fornax cuneatus** n. sp.

5 mill. 3/4. Corps allongé, peu connexe, atténué en arrière, d'un brun noirâtre; pubescence jaune peu serrée. Épistome très rétréci à la base, aussi large que l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes ferrugineuses atteignant la base du prothorax; deuxième article subégal au quatrième; troisième aussi long que les deux suivants réunis. Pronotum aussi long que large à la base, rétréci en avant dans sa partie antérieure, arrondi sur les côtés; ponctuation fine, écartée, non rugueuse sur le milieu, plus forte sur les côtés. Élytres graduellement atténués à partir de la base; strie suturale seule distincte; ponctuation fine et écartée. Dessous du corps d'un brun rougeâtre. Sillon antennaire large, peu profond, faiblement, mais distinctement limité en dedans, fermé en arrière par le prolongement du bord postérieur des propleures. Celui-ci, plus court que l'externe. Saillie prosternale assez fortement ponctuée. Épipleurées des élytres graduellement rétrécies en arrière. Épisternes métathoraciques parallèles, deux fois plus étroites que les épipleures à la moitié de leur longueur. Métasternum couvert d'une ponctuation grosse sur les côtés. Hanches postérieures dilatées en dedans, fortement rétrécies en dehors, leur bord externe aussi large que les épisternes. Pattes ferrugineuses; tibias postérieurs aussi longs que les tarsi; premier article des tarsi postérieurs aussi long que les autres réunis.

Cette espèce appartient au groupe à deuxième article des antennes subégal au quatrième et à élytres à strie suturale seule apparente. C'est la première espèce de Madagascar qui entre dans ce groupe; elle se place près de *Lésleuci* de Bourbon.

FORNAX MADAGASCARIENSIS. Cast.

FORNAX FILICORNIS. BOIV.

Un exemplaire de 13 mill. 1/2.

FORNAX SUBLABELLATUS FAITH.

Un grand exemplaire ♀ de 11 mill. 1/2 dont les antennes sont filiformes.

Malgré la grande différence de taille, je n'hésite pas à rapporter l'insecte de M. Mocquerys à cette espèce.

**Fornax convexus?** Fleut.

C'est avec doute que je rapporte à cette espèce l'unique exemplaire récolté par M. Mocquerys. Le deuxième article des antennes est deux fois plus petit que le quatrième; le premier article des tarsi postérieurs est plus court que les autres réunis. Malheureusement, je n'ai pu le comparer au type qui est au Musée de Leyde.

**Fornax minutus** n. sp.

5 mill. Corps allongé, peu atténué en arrière, d'un brun noirâtre plus ou moins foncé; pubescence d'un gris jaunâtre. Tête à ponctuation serrée. Épistome très rétréci à la base, plus étroit que l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes noirâtres, dépassant la base du prothorax; quatrième article deux fois plus long que le deuxième, mais moins long que le troisième. Pronotum un peu plus long que large à la base, atténué en avant dans la seconde moitié; ponctuation assez forte et rugueuse. Élytres atténués dans leur tiers postérieur, distinctement striés, couverts d'une ponctuation rugueuse moins forte que celle du pronotum. Dessous de même couleur. Sillon antennaire large, peu profond, à peine distinctement limité en dedans, fermé en arrière contre l'angle postérieur du prothorax; saillie impressionnée, arrondie au sommet. Épiptères des élytres peu rétrécies en arrière dans la partie antérieure. Épisternes métathoraciques parallèles, plus étroites que les épiptères. Hanches postérieures dilatées en dedans, anguleusement rétrécies en dehors, leur bord externe de la largeur des épisternes. Dernier segment abdominal arrondi. Pattes d'un ferrugineux plus ou moins obscur.

Espèce très voisine de *Alluudi*; épistome plus étroit à la base; cinquième article des antennes seulement un peu plus long que le quatrième; sillon antennaire peu profond, faiblement limité en dedans.

**Plesiophornax Perroti** Fleut.

**Arrhipis madagascariensis** n. sp.

6 mill. 1/2. Cette espèce ressemble beaucoup à *orientalis*. Sa ponctuation est moins serrée. Pronotum un peu plus long, déprimé sur le disque, marqué d'une ligne lisse bien apparente au milieu de la base. Élytres plus distinctement striés, leur extrémité moins pointue. Dessous du corps à ponctuation moins forte et moins serrée.

Voisine aussi de *castanea*.

**Hypocœlus Mocquerysi** n. sp.

6 mill. 1/2. Corps allongé peu convexe, légèrement atténué en arrière;

d'un noir peu brillant en dessus avec le pronotum rouge. Tête à ponctuation peu serrée, non rugueuse. Épistome peu rétréci à la base, aussi large que l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes noires avec le deuxième article ferrugineux, épaissies vers le bout; deuxième article plus court que le quatrième; troisième aussi long que les deux suivants réunis; dernier atténué vers le bout. Pronotum plus long que large, à peine atténué en avant, marqué d'une ponctuation assez forte, écartée, non rugueuse, et d'un sillon profond au milieu de la base. Élytres faiblement atténués en arrière, à peine distinctement striés, marqués d'une ponctuation fine et écartée. Dessous du corps d'un brun noirâtre, rougeâtre sur le propectus; ponctuation forte et écartée sur le propectus; plus serrée sur le métasternum, fine sur l'abdomen. Propleures faiblement creusées le long du bord externe. Sutures prosternales bien marquées. Saillie atténuée en arrière, relevée au sommet. Épisternes métathoraciques étroits parallèles. Hanches postérieures transversales, légèrement dilatées en dedans, leur bord externe deux fois plus large que les épisternes. Dernier segment abdominal arrondi, pattes brunes, tarsi plus clairs.

Cette espèce est remarquable, en dehors de sa coloration, par ses antennes épaissies et ses hanches postérieures transversales. Sa place est près d'*asperatus*.

#### CEPHALODENDRON GIGAS Fleut.

Le type est une femelle. Le mâle est plus petit (21 à 23 mill.), ses antennes sont plus longues, longuement bipectinées à partir du troisième article, y compris le dernier. La femelle atteint 30 millimètres.

#### *Fœaia emarginata* n. sp.

5 mill. 1/3. Corps oblong, assez convexe, subparallèle d'un noir mat. Tête convexe, à ponctuation médiocre serrée, non rugueuse, faiblement sillonnée au milieu. Épistome peu rétréci à la base, aussi large que l'espace compris entre lui et l'œil. Antennes noires, à deuxième article ferrugineux, ne dépassant pas la base du prothorax: premier article aussi long que les trois suivants réunis; deuxième très court; troisième à dixième subégaux graduellement dentés, le dixième deux fois plus large que long; onzième en ovale allongé. Pronotum plus long que large, parallèle, rétréci en avant seulement près du bord antérieur, couvert d'une ponctuation assez forte, très serrée et rugueuse, marqué au milieu, dans toute sa longueur, d'un sillon profond à la base et de deux faibles impressions vers le milieu, placées dans le sens transversal. Élytres subparallèles, très légèrement atténués en arrière, rétrécis dans leur tiers postérieur, assez profondément striés et couverts d'une rugosité moins forte que celle du pronotum. Dessous d'un noir un peu brillant à cause de la ponctuation moins serrée. Sillon antennaire profond, lisse, limité en dedans par une carène.

Saillie prosternale parallèle entre les hanches, brusquement rétrécie au delà et terminée en pointe. Épisternes métathoraciques larges en arrière, fortement rétrécis en avant et formant un triangle allongé. Hanches postérieures subparallèles, à bord inférieur sinué. Dernier segment abdominal échanuré. Pattes noires, tarsi ferrugineux.

Très voisine de *singularis*; en diffère par ses antennes (sauf 2<sup>e</sup> article) et ses pattes (sauf les tarsi) noires et le dernier segment abdominal échanuré.

DIAGNOSES DE *PTINIDES* ET *ANTHICIDES* [COL.] DES COLLECTIONS  
DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. PIC.

**Ptinis Languetii** n. sp.

Peu allongé, presque parallèle, noir, orné de dessins blancs avec les antennes et pattes roussâtres: soies dressées assez longues, en partie obscurcies. Tête avec les yeux petite, moins large que le prothorax; antennes roussâtres, assez fortes, plus longues que la moitié du corps, non épaissies à l'extrémité. Prothorax court, élevé en bosse transversale sur son milieu (celle-ci un peu dilatée sur les côtés) transversalement sillonné, déprimé antérieurement, modérément étranglé devant la base et un peu élargi ensuite sur les côtés. Écusson assez petit, plus long que large. Élytres bien plus larges que le prothorax, peu longs, droits en avant et sur les côtés antérieurs (avec les épaules arrondies et saillantes), un peu atténués à l'extrémité, peu convexes; ils sont d'un noir brillant et présentent les dessins suivants, faits d'une pubescence écailleuse blanche et dense: une grande macule humérale ne paraissant pas atteindre la suture et une fascie postmédiane, celle-ci prolongée en arrière sur la suture de façon à dessiner une sorte de V commun aux deux étuis, pourtour postérieur des élytres également orné de pubescence blanche; élytres à stries peu profondes et finement ponctués avec les intervalles assez larges, nettement ponctués en lignes. Pattes assez robustes, roussâtres.

Long. 3 mill. Tonkin (Langue), 1886.

Rappelle *Pt. Theresae* Pic, du Brésil, mais dessin élytral différent, antennes claires, moins fortes, prothorax plus élargi au milieu, etc. Dédié au voyageur qui a rapporté cette espèce.

**Ptinus sulcithorax** n. sp.

Subovalaire, assez large sur les élytres, brun roux sans taches, hérissé de soies jaunâtres irrégulières, avec les antennes, les pattes et le prothorax